

**DE EPISTAXI  
DISSERTATIO  
INAUGURALIS  
QUAM AD  
SUMMOS...**

---

Bartolomeo Cuzzetti

DE  
EPISTOLIS  
DOCTORATU BACCALAURIS  
QUAE  
AD HONOREM MEDICINAE  
IN  
IN ARTE MEDICA  
ACQUIRUNTUR  
IN VETERINARIO AC CLEMENTINO  
ARCHIGYMNASIO PATAVINO  
PUBLICE EXPOSITAE

Bartholomaeus Capretti

PRIMA



PATAVII  
TYPIS PENADA  
BROCKEL







ALLE FIE MANI  
DEL BENEVOLO CONGIUNTO  
CHE  
IN RUINOSO E MALIGNO MORBO  
DI GENTRICE MIA  
MOSTROSSI DI SUA SALVEZZA  
SAGACE MINISTRO



L'AUTORE RICONOSCENTE E MEMORE  
QUESTE POCHE LINEE  
DEDICA E CONSACRA







## DE EPISTOLIS

Inter infinitam propemodum numerorum scribentium, quibus neque neque humanam gratiam confectis, varium hæmorrhagiam, de qua non nisi sermo est, frequentissime occurrit. Nec mirum statim ac desiderabilem varium internarum tractant, sub litteris preteritis solito, machinam illam cum cordis, oculis, lingua, diaphragmate, quæ aliquando cum corpore coarctant, scilicetque in ipsa accensam potentissimam legem per considerant. Argumentum non magis ponderis est, nec meâ humanis servandum vestra tenet, sapientissimi viri, humanitate atque benivolentia factus aggreditur, et quomodocumque perficitur.

Varium hæmorrhagiam epistolam dicitur, de illa diarrhœa. Est enim sanguis vel per utrumque, vel per alterutrum tractum internam sportant, non vero a posterioribus varium huiusmodi

6

in fluxu delicta per ea evadit. Rarus modo magno riuulo profuit magis, modo stillicite de-  
cidit: si prima, proprie autem leucorrhœiam  
vocant uulsi; si altera, stillicidium appellant,  
verum utroque riuulo nobis variat, si, de id diffe-  
rentia minus solliciti, quodcumque magis ex  
internis scribis profuturum epistole nomine com-  
perendamus.

Epistole modo circulatorum constitit morbum,  
modo alteris superaddit in vicio humorum sta-  
dio, aut critica, aut symptomatica. Preter-  
ea tributa est in habitalem, vel accidentalem:  
in periodicam est vaga: in hereditariam, vel  
adventitiam in acutam, vel chronicam: in allo-  
pathicam, vel sympathicam. Tronquata etiam mo-  
do est, alia spontanea, nec non epistemicum inter-  
dum genio pressari riuo est, aut potius ut epide-  
micæ morbi frequentissimum symptomata se prede-  
re. Tandem variis facies ejusdem peritio in  
activam et passivam.

Abque ulla peritio signa repente interdum  
epistole manifestat. Illos spectat passiva, non  
autem se illo, que extremam violentiam curam  
apponit. Altera vero solet habere prodroma in-  
duta ipsam præmonens, que distensa infla-  
mentis liquorum riuulo sanguinis ad caput im-  
petum adactum agunt. Illos perducunt facies

lento, infusa, ruber, capitis, ac praesertim occipitis gravitas, vel dolor; carotidum, ac temporum arteriarum violenta pulsatio; oculorum rubor, suffusio, lachrymatio; visus hebetudo, simulacrum, vertigo, mentis functionum perturbatio; somnolentia, vertigo, stupor, pariter nocturni, praesertim carinae. Haec quoque spontaneae laesae corporis laetitia, occitantes, horripilantes, perfrigidantes, quibus interdum dyspnoea, vomitus, aliaque adjunguntur. Haec denique pulsi pleni, tendentes, dicroti non raro in aliterio tantum ex capite; acuti non recensita nonnulla signa in aliterio tantum capitis ac faciei parte observari solent: quo quidem in caso ex ipsius lateris nate, in quo haec solentur, haemorrhagiam expectandum esse medici testantur.

Interim praesentibus pluribus, praedictis et nonnullis signis, frequenter incrementis acutius praesentibus, qui ad scalpudum incit, vel stimulatione interdum praesente, sanguis nullus, facile coagulabile praerumpit. Cogitur suspicari non raro in polypum massam extra utero prolapsum, ac ipsam coactam coagulationem, qui decidua, vel uterum, ubi non ita sequitur profluvium sanguinis coarctandum. At si nullus sit haemorrhagiae, acutius sub coagulo fluxu cessare vel symptomata leniri, vel praesentia cessare, congruenter medici ac



habere; ita si gonorrhœa, vel apertæ, vel præputiæ situat, ophthalmus, vertiginis, asperit, delirij, inflammationis, aliorumque morborum origo sit non semper pertinens ad illa.

Porro vitæ illa ex supra dictis signis scilicet ætatem ætatis hæmorrhagiarum indicantibus procedentibus, ut et qualitas siccitatis sanguinis trahi, soluti, coagulati aut citi coagulatio coagulabilis, pulchritudo uetus et uetus recta coagulatio, vitæ insignis depresso additis status ætatis interdicti consideratione, possunt epistaxis diagnosin facili exhibere.

Contingit vero periculis, si sanguis aut coagulatus, aut fluidus per posteriores vias aperte in fures, atque inde in oropharynx, in ventriculum alia etiam in pharynx delibatur, ore non peruenit, aut quædam effunditur; ex quo consequitur plures ad hoc intentum struere, ut pro hæmorrhagis, aut hæmorrhagis morbo impant.

Frequentissimè enim morbus hæmorrhagis pro cætera parva, atque adolescentis magis venit. Revera sicuti molles et huiusmodi membra hæmorrhagis viscerum propugnibus instructa ex non dicit, ut ex fide ad hanc sanguinis impetu, vel citi morbo frequentissimè hæmorrhagis morbo explicatur, ita ex citi, qui sanguis majori copia ad caput dirigitur, ipsam idem facit

consequere argueret. Haemorrhoidali, plethorici, spiritibus liquoribus indulgentes, diuturnis viscera abdominali infertilibus detenti, studiis profusis delecti, palamentibus confecti, somnolenti facillime ad epistulas predispositionem contrahunt, nec non illi qui aliquo mariam, vicinarumque partium vicio laborant.

Inter occasionales epistulas causas memorantur omnes illae, quae vel caput nervi vicinamque capitis partem agunt, vel illis in partibus insidentes, vel suffocantes sanguinis circuitu id efficiunt, ut hic caput quantitate ac impetu aeris rursus patet, ex his densum crepitans, vel quocunque modo sanguinem ad caput inclinat, vel ejusdem redditum impedit, posse concipiuntur; uti sunt compressio, distractio, contusio, variis vulneribus, ulcere, polypi, instrumenta mechanica, nervi vapores relaxati, vel hujus generis quaecunque stercora, insolatio, calor ex igne ardente, vel ex hypocausto in caput actus, nimis stricta collaria, similia. Haec quoque spectant violenta nimis pathemata, vigiliae, vehementia exercitia, strabismus, claudere, tonsa, ejulatio, aeris ac spirituum abusus, suppressio aliarum evacuationum, membrorum matitiae, frigoris intemperantia. In haec etiam causas veniunt inflammationes non capitis tantum, sed et aliarum partium, non secus ac causae

thematia ventralia, tum abdominalium viciorum infectas, hepatis praesentias et luesis, ventriculus atque intestina cibus, stilibus, ulceribus obecta. viciorum ipsi in intestinis nidulantes. Hac denotata accommoda illis omnia, quae variam viciorum luctati ferunt, uti et discretis, nec non in hanc haemorrhagiam habilitudo.

Quod epistaxis propositis pertinet, luesis ipsa est morbus in pueris atque adolescentibus, quia, sublevis per totitatem, ut inquit J. P. Frisch, humorum ad caput congestione, sponte atque dissipetur. Virum tamen si atque frequentius interdum, et levibus causis de causa evenerit, notam insitit lateris haemophilicis juvenili aetate. Magis periculosenda epistaxis, quae hereditaria est. In juvenibus atque haemophilicis parvulis epistaxis. In senibus generatim est magis viciosa, in his enim apoplexiae praesentia atque subindevenit fuit. Generatim epistaxis viciosa via periculosa non solus, ubi adeoquod capiti ac frequentius reperitur. Contra majorem atque locum notam parvula. Bonam causam pertinet epistaxis, cum in ipsa notata, quae prius viciosa, dispartit epistaxis, ut cum defectu supplens viciosa haemorrhagiam; quod jam insit Hippocratis inquit: mulier, menstruus deficientibus, e mulieris sanguinem suum bonum.

Quasi neque machinandi sit opusculi, quotidiana docet observatio, jamque ex divini Senis operibus colligere est, ex variis haemorrhagiis abnormes ad articulos, dolores capitis, et variam avertitatem, tremorem vertiginem, mentis perturbationes, morbos quos plurimos acutos fluxus et refluxus sanguinis judicari, aut saltem, quae quidem causa posterioris aevi confirmantur observationem. Quod si juxta pariter sit sanguinis fluxus, vel aliquis de causa praepostere collatus, causas tunc nullo negotio excelsi possunt pathemata, et capitis praeterea morbi, vertigo, cephalaea, insomniis, variam taciturnitatem, aediam, apoplexiam, convulsionem, cetera parti pertineantia.

Quae in morbis contingit variam haemorrhagiam, utram salutaris, critica, an symptomatica sit, an morbi indole non minus, quam ex hujus studiis, et causis inde effectibus dyadendum. Quoties vero levissima expectandum ab epistemi in febribus, ac generaliter in morbis cum statu phlogistico sociatis, si atque quantitate fiat sanguis, aptaque tempore, tantum generaliter pertinet ad discrimina in febribus acutis, malignis, hujusque indolis cruditatibus.

His quoque generaliter cunctis variis haemorrhagiis in longa chronica affectionibus cum aetate viribus debilitate incedentibus, in viciniam

liba, cachexia, hydrops, scorbuto et similibus, etiam etiam non insigni copia sanguis fructatur.

Mulius pariter si horrores, rigores, tremor sa-  
dentes, convulsiones, delirium, singultus, extenua-  
tum frigus epistaxis eripiant. Periculi plena  
constat, quae hostili, incisione detectis, viri-  
bus exhaustis contingit. Lepthorax, syncope, ca-  
lida haemoptoe ac virium concidantur signa epi-  
staxis subsequens, sicut haec in mactando in  
activa, contra magis periculosa censenda in passi-  
va. Ille videns consideratio sanguinis effusio,  
qui quo magis naturali crasi ac qualitate dis-  
tinctus, eo magis oculatus discerneret. Ceterum ex  
abscessu sanguinis a caribus proflant quasi furo-  
ri causi possint affectus in cetera se coeque, in  
quibus a moderato ipsius fluxu homines expecte-  
ri possunt, non est cur dicamus. Eius tamen ac-  
tione spiritus vitalis saepe operari, et plerumque  
interdum vires contractas habundantius non in-  
ficientur.

In epistaxis curatio eo primam spectare de-  
bet medicum, ut debeat scire ut an passi-  
va, maxime vero utrum adactis, critica sit, an  
symptomatica, habita semper causarum ratione, et  
quibus orta est ac foret, non uox ac illorum  
adjutorum, quae in regulam quocunque crasi  
praedictam considerationem exporere videntur.

Quapropter utrum sitanda sit, ut etiam praesentia, ut compensanda epistolarum solo impetandam Porro effensa consideranda agnoscant ac symptomatizant, quae praesentia, observatio effensa, qui singulis duntaxat consistant ac consequantur, morbi, in quo haemorrhagia supervenit, isola, ut etiam tempus, quo curatque, quibus locis singulis, agri actus, temperantiam, constitutio, cetera, si quae sint, adjuncta tollenda sunt adjumenta, quae medicamentis ita dirigant, ut dum salutare naturae vires solo pecto turbant duntaxat, eodem etiam tempore isola, propterea opus, obsequatur, et cetera, ac salutare singulis praesentia praesentia compensant, gravibus praesentia solo agnoscant. Hinc quoque generatione etiam curat etiam epistolarum quae praesentia adolescentis, juvenis, regis, solentis, non plures, phthisica adjuvant, tam cum quae in morbo supervenit cum etiam phlogistica aetate, ut in illa, in quibus singulis impetus ad caput speciatim dirigatur, tam vero cum, quae supervenit alterius singulis evacuationis implet defectus, nullam requirere auxilium, illis exceptis quae eo spectant, ut jure agri etiam et adjuncta inter haec elementis singulis evocant.

Ex hisce sunt, phthisica interius in eo inveni-

lens, ut epistola, cum pars omnia sit, et persens symptomatica, quae angustia hepatica ad aurium et caput non inclinationem demonstrant, persens praesentibus reperitur ex aqua calida attracta, appetitus retrocedit hirsutibus in interiora cere applicitis, aut irritabilibus admodum, quae si tota non colant, et robur, actus, temperantur, curas, felix accedens atque alia indicant ad angustia inclinationem hancque, prout opus, repetitam praesentibus confagere, eoque salutem, quae graviora symptomatica ab epistola, vel parte, vel sponte, aut interpositione colabitis subeunt, aut latere comparanduntur.

Sicuti ratione ab ipso angustia a sensibus praesens moderato, tum ipsius haemorrhagiae, tum symptomatum leuiores contingit, ipsaeque hanc angustiam hypothyria terrore non semper debet; ita conuenit, si ex nimis angustia depositions periculum testet, ut tota viribus non nitendum, ut fastidi praesentibus effectus, opportuno in mentis ductis auxiliis, tum quando haemorrhagiae vent, tum quando jam sint colabitis, ut praesentibus recidens. Tempore haemorrhagiae (ita Barrovia) ex adhibentur, quae angustiam distant. Haemorrhagiae jam colabitis, vel ductus protracta, curas non efficiendi occurrunt.

Iam ratione auxilio praesens vent curantur

affluentibus quantum fieri potest moderatis; hinc calidiori calor temperandus, nimis vitanda lux, expertus victus, spirituum caliditasque potus moderandus, strictus servandus tractus et capitis altus, maxime corporis minisque quies concilianda, co-ventum a loquela, tussis, sternutatione, et quocunque morbo irritatione. Simul etiam conveniet tepida pechleris in remum ducere atqueque clausura chysteribus aperire: Interdum praestante pulsatu pleuritibus, rigore, duritie, iterata sanguinis ululatio fit locus non solum ad carotidum tangendis quantitates immutandam, sed ad ejusdem impetum a capite ducendum. Hinc sanguis a pede ululo promptum saepe statim remedium ad temperandam epistaxiam. Interdum ducta tunc sit, potus diluatus, temperatus, subacti, nitati, ad frigida potius vergentes.

Quod si hanc interta angula eo magis fluere propterea ut epistaxis jam passiva cesset, vel tale ab initio fuerit, tam statim confagendum ad illa arcula, quae angulata fluxum ducere valent, et eo citius, quo majus hauriat ex irritatione, summaque videtur praestitutio periculosa. Tunc ergo appetitus ferat splenis ex aqua frigida, vel cyperis infusa fronti, temporibus, cervici, occipiti, dorso, pedibus ululata, non solum ex hujus generis insperata: triplicem ex ori ululato-



ne cum aceto, vel schistograbibus pulveribus confusa fronti inposita. Sarcini quoque sunt utraque torcular carbasus inditus aceto, aqua Rubelli, solutione rhubarbi, gummi illis, ceteris, vel aqua stypticis indutus, membra pulveribus conspersa. Fubigo, teste Boerhaave, et alia ad membra non sunt, cum abscissis viti subacta, ac torcular, vel gausapio excepta affundere et rivos intrudat; sunt etiam cum utilitate adhibetur bolus ignis-rum, tum palma et coarctata lecta. Illa adhibetur, prout aqua, inpositio et aqua frigida, vel ex schistograbibus decoctionibus, solutionibus, et oleis destillatis. Aliquando rivos, et quibus sanguis fluit, compressio hemorrhagiae exemplo torcularis sufficit, illis tunc compressum alio modo compressis fluxum non raro detinet, quod peritus de compressione interna auribus dicto torcularis est, danti consilii colubinae. Morgagni, qui epistatibus pulverem juxta nasille reductum compressum potest torcularis ducere, et valde compressione evanescit, in aceto torcularis.

Intus prospiciendum status est posterioribus carbasus aperire, per quem sanguinem in cephalum, non non in pharyngem cum periculo protrahi potest. Quapropter, clausis etiam posterioribus carbasus la facit colla, ut, ut clausis angulis facilius curaretur, unde hemorrhagiae

causis. Hoc consilio servandis in tunc infirmis-  
das ita illo affligatur, ut per tunc anteriores ad  
fuerit temperata in partibus, ex quibus magis  
fuit, applicari, et pro opportunitate hinc inde tra-  
hi queat. Quae tamen polypose concretiones  
intus tunc efformantur, sincedae dunt sponte  
deciduas, ne, his distractis, renovetur aut aliter  
adhas sequatur haemorrhagia.

Suntque quaeque afflictae sunt consuetudine tunc  
dolor, tunc arthritides dunt, scapulae, cervici, ut,  
non hypochondria applicitae. Et tunc non tantum  
ex sanguinis evacuatione, aut revulsione, sed ex  
vario circulo, quae supra tunc evadunt, et a  
nervibus detrahunt proficere consuevit exacerbatio.  
Hinc etiam repetendus affectus, quoniam in epi-  
stasi producant frictions, rubefactiones, vesica-  
tiones, tunc etiam repente incassus, ut et imper-  
tinentes frigides in faciem, dorsum, ubi incipiente  
sepro facies non solum epistasis consequuntur.  
Sunt ex varietate artubus infectis, et sanguinis  
per venas sequeas retardatos, non vulgus in ob-  
staculo epistasi utilis fuit calidiorum. Dunt  
ex tunc dictis primum ut concipere, epistasis,  
quae haemorrhoidum, aut catameniorum vicem ge-  
rit, haudquaquam prohibendum tunc, nisi prius  
certum fuerit, quod restituantur hinc spontanea et  
periodica angustia genitalia, illo tamen semper

exceptis casu, in quo ab excedente sanguinis evacuatione discrimen habetur.

Quam epistaxis ab alio morbo solvatur, aut sympathica est, potius tunc attentis ad morbum priorem, et causam qua fovetur, convertenda est. Illic patet esse epistaxis, quae sub intermissione febrium levis incidit, cortice periculo vacatur; cur epistaxis a nervosis affectionibus exorta antispasmodica, nervina succurrit; cur scribibus longioris vacillat, aut interitibus, nilum praestant affectum ad easdem compositiones amittere, aut purgatis, quod de antihystericis dicendum, cum a vasisbus producantur; cur nervosa et maligna in febribus, morboque vetere acrius haemorrhagia torica, nervina, cataplexis, epistaxis caputales, cur epistaxis subacuta viribus debilitata pro cura opusculi victus antileptici, vini, crassulicorum, cortice peruviani, martialis usum requirat; cur decessus alius ad ipsam devocendum periculum vigetis decessus appropinquat recedat, vel solvenda.

Quae ab organico vitiis fovetur epistaxis, vel palliativam generationem quaticum adest, vel enim organico vitiis tollendo locus concedatur, de epistaxis medicata tollenda via sperandum. Interim nunquam liquere debet praeciptum, quae decessus urgentiori succurrendum esse.

Varia hæmorrhagia cœcæ, per sæ longum  
 tempus quasi obdormiret, sepe necesse est co-  
 ventus, ac factum in moribus regulam statu-  
 unt, donec sponte decidat. Hoc autem decidit,  
 cum ita facile illorum non indulget, quæ in-  
 tentionem morbus inferre videt. Pro morbum vero,  
 quibus fuit producta, et vitium, quæ supervenit,  
 adjunctionemque varietate, variis tam dieteticis,  
 quam medicis auxiliis bene proceditur.



## THESES DEFENDENDAE

## I.

*Narvae hemorrhagiae frequentior in pueris quam in senibus.*

## II.

*Optimum apertis pollicis facilius.*

## III.

*Tobaci et feni abusus juveniles affectus perniciosis inducit.*

## IV.

*Divisio morborum in dynamicos et organicos est justificata.*

## V.

*Naturalem humilis positionem verticalem esse debere, ex anatomia probatur.*

## VI.

*Remedia domastica vulnus contrahenda.*

## VII.

*Diastolici errores etiam levisimi in auscultum morborum curatiue diversi evadunt.*

## VIII.

*Demulso masticatum in quacunque aperto semper inflammationem excitare inducit.*

## IX.

*Abolitis virginitatis signa non dantur.*

